



Voor het kweken van de **snelgroeïende plant** op **kokos!**



CANNA COCO

CANNA COCO meststoffen zijn complete selecties van hoogwaardige producten, die een explosieve groei en uitbundige bloei van snelgroeïende planten op voorgebufferde kokos probleemloos bewerkstelligen. CANNA COCO voeding wordt gebruikt als een uit twee delen bestaande formule voeding A&B. Deze voeding wordt gedurende het gehele proces van groei en bloei toegediend. CANNA COCO voeding garandeert u een optimaal resultaat, gebruiksvriendelijkheid en een hoogwaardig eindproduct vrij van toxische ballaststoffen. CANNA COCO voeding in combinatie met CANNA COCO Professional Plus medium stelt een (beginnende) kweker in staat te kweken als een doorgewinterde specialist.



CANNA RHIZOTONIC

Deze krachtige wortelstimulator verhoogt de algehele weerstand van de plant. Een plant heeft minder weerstand als ze bijvoorbeeld; jong, recent verpot of gesnoeid is. CANNA RHIZOTONIC voorkomt in zo'n geval een shock (stress). Het stimuleert de ontwikkeling van de plant en het verlaagt de kans op ziektes. CANNA RHIZOTONIC is een vitaliserend plantenextract dat de wortelgroei bevordert. Het is rijk aan meer dan 60 biologische sporenelementen en vitamines, die er onder andere voor zorgen dat een nieuwe stek snel aanslaat. Een overgeplaatste plant kan, dankzij CANNA RHIZOTONIC, makkelijk doorwortelen in het nieuwe medium. Voor een snel en krachtig wortelstelsel kan, naast het toedienen van CANNA RHIZOTONIC, ook bladbespuiting op het gewas worden toegepast. Dit is vooral aan te raden als de plantjes zelf nog weinig wortels heeft gevormd.



CANNAZYM

CANNAZYM is een enzympreparaat dat is ontwikkeld om afgestorven plantenresten af te breken. Door het gebruik van CANNAZYM blijft het medium vrij van ongewenste dode wortels en schadelijke micro-organismen. Deze micro-organismen zouden zich anders in het dode plantmateriaal kunnen ontwikkelen, waardoor de plant ziek wordt.

Door de snelle vertering van wortelresten en het voorkomen van bacteriën, ontstaat er een verbeterde luchtwaterhuishouding in het medium. De plant wordt gevoed met mineralen en suikers, die door de werking zijn vrijgekomen en voor een extra stimulans zorgen. CANNAZYM is een medium- en bodemverbeteraar, die ervoor zorgt dat het groeimedium meerdere malen kan worden hergebruikt. CANNAZYM bestaat uit meer dan 15 verschillende enzymen. Daarnaast bevat het product ook vitamines en extracten van woestijnplanten. Deze elementen dragen bij aan een verbeterde opname van voedingsstoffen.



CANNA PK 13/14

CANNA PK 13/14 is een mengsel van bloeistimulerende mineralen van de hoogste kwaliteit (levensmiddelenkwaliteit). CANNA PK 13/14 is een hoogwaardig fosfor-kaliummengsel, dat wordt toegevoegd in de bloeifase. Deze elementen spelen een grote rol tijdens de bloeifase van de snelgroeïende plant en zorgen voor een versterkte bloei. Door een speciaal productieproces is CANNA erin geslaagd het zuiverste fosfaat (P) en kalium (K) in zeer hoge concentraties samen te voegen. Hierdoor is CANNA PK 13/14 niet alleen makkelijk voor de gebruiker, maar vooral snel en direct beschikbaar voor de plant. Het kost de plant dus weinig opname-energie en deze kan zich hierdoor maximaal concentreren op de groei en bloei.



CANNABOOST Accelerator

CANNABOOST Accelerator is een opbrengst- en kwaliteitverhogende bloeistimulator, speciaal ontwikkeld voor de snelgroeïende plant. Het stimuleert de ontwikkeling van nieuwe vruchten. Hierdoor worden de vruchten van de plant voller. Naast de bloeistimulatoren bevat CANNABOOST Accelerator ook natuurlijke bloeiregulatoren. Deze zorgen ervoor, dat zowel de bloeistimulatoren uit de booster, als de van nature in de plant aanwezige bloeistoffen en energie, beter worden gedoseerd. Hierdoor kunnen de vruchten zich regelmatig ontwikkelen en afrijpen, wat een homogener oogst oplevert. CANNABOOST Accelerator staat niet alleen garant voor hogere opbrengsten, het zorgt ook voor een intensere en vollere smaak.



| | Teeltduur | | COCO | RHIZOTONIC | CANNAZYM | CANNABOOST | PK 13/14 | EC + | EC Totala |
|---|------------------|--------------------|-------|------------|--------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| | in weken | in uren | | | | | | | |
| VEGETATIEVE FASE | | | | | | | | | |
| Start / inworteling (3-5 dagen) Niet maken substraat COCO | <1 | 18 | 15-25 | 40 | - | - | - | 0,7-1,1 | 1,1-1,5 |
| Vegetatieve fase I - Plant ontwikkeling in volume | 0-3 ¹ | 18 | 20-30 | 20 | 25 | - | - | 0,9-1,3 | 1,3-1,7 |
| Vegetatieve fase II - Tot aan groei stagnatie na vruchtzetting of verschijning formatie bloemen | 2-4 ² | 12 | 25-35 | 20 | 25 | 20 ⁵ | - | 1,1-1,5 | 1,5-1,9 |
| GENERATIEVE FASE | | | | | | | | | |
| Generatieve periode I - Bloem of vrucht ontwikkeling in lengte. Groei in hoogte tot staan gebracht | 2-3 | 12 | 30-40 | 5 | 25 | 20-40 | - | 1,4-1,8 | 1,8-2,2 |
| Generatieve periode II - Bloem of vrucht ontwikkeling in volume (breedte) | 1 | 12 | 30-40 | 5 | 25 | 20-40 | 15 | 1,6-2,0 | 2,0-2,4 |
| Generatieve periode III - Bloem of vrucht ontwikkeling in massa (gewicht) | 2-3 | 12 | 20-30 | 5 | 25 | 20-40 | - | 1,0-1,4 | 1,4-1,8 |
| Generatieve periode IV - Afrijping proces van bloem of vrucht | 1-2 | 10-12 ³ | - | - | 25-50 ⁴ | 20-40 | - | 0,0 | 0,4 |

GROEI

BLOEI

- Deze periode verschilt per soort en aantal planten per m2. Moederplanten blijven tot het eind in deze fase staan (6-12 maanden). De omschakeling van 18 naar 12 uur verschilt per ras.
- Vuistregel is omschakelen na 2 weken.
- Lichturen verminderen indien rijping te snel verloopt. Waak voor relatieve luchtvochtigheid.
- CANNAZYM dosering verdubbelen naar 50 ml/10 liter, indien substraat wordt hergebruikt.
- Standaard 20 ml/10L. Voor extra bloeikracht opvoeren tot maximaal 40 ml/10L.

EC: EC+ waarde is gebaseerd in mS/cm bij EC water = 0.0 bij 25°C, pH 6.0. EC van gebruikt kraanwater optellen bij de geadviseerde EC.

pH: Geadviseerde pH waarde tussen de 5,5 en 6,2. Toevoeging pH min kan EC verhogen.

Gebruik altijd pH min groei, zowel in de vegetatieve als in de generatieve fase.

De richtlijnen in de tabel gelden niet als ijzieren welten, maar kunnen beginnende kwekers op gang helpen met ontwikkelen van een uitgekende bemestingsstrategie. De optimale bemestingsstrategie wordt verder bepaald door factoren als: temperatuur, luchtvochtigheid, plantsoort, bewortingsvolume, vochtpercentage in het substraat, watergeefstrategie etc..

Maak je persoonlijke voedingsschema op www.canna.nl